

Dominanta
pharmaceutical company

ДИКЛОФАРМ

Информация
о лекарственном препарате





СОСТАВ на 1 г препарата

действующее вещество:
диклофенак натрия – 10 мг

вспомогательные вещества:
Карбомер – 15 мг
Этанол (96%) – 150 мг
Изопропанол – 150 мг
Троламин – 30 мг
Метилпарагидроксибензоат – 1 мг
Вода – 644 мг

Диклофарм

Рег. номер ЛСР-009582/09-291018

Гель для наружного применения 1% в алюминиевой тубе

Производство: Болгария

Статус регистрации: ЛС

Масса: 50 г

Фармакотерапевтическая группа: нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП)

Срок годности: 3 года

Условия хранения: при температуре не выше 25° С






Диклофенак – нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), обладающий выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием.

Угнетая циклооксигеназу 1 (ЦОГ1) и циклооксигеназу 2 (ЦОГ2), нарушает метаболизм арахидоновой кислоты и синтез простагландинов, являющихся основным звеном в развитии воспаления.



При местном нанесении проникает через кожу в ткани и синовиальную жидкость. В синовиальной жидкости концентрация препарата сохраняется дольше и выше, чем в плазме крови.

Количество диклофенака, который всасывается через кожу, пропорционально времени контакта геля и площади его нанесения.





ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Боли в спине при воспалительных и дегенеративных заболеваниях позвоночника (радикулит, остеоартроз, люмбаго, ишиас).
- Боли в суставах (суставы пальцев рук, коленные и др.) при остеоартрозе.
- Боли в мышцах (вследствие растяжений, перенапряжений, ушибов, травм).
- Воспаление и отечность мягких тканей и суставов вследствие травм и при ревматических заболеваниях (тендовагинит, бурсит, поражения периартикулярных тканей, лучезапястный синдром).



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Повышенная чувствительность к диклофенаку или другим компонентам препарата.
- Склонность к возникновению приступов бронхиальной астмы, кожных высыпаний или острых ринитов при применении ацетилсалициловой кислоты или других НПВП.
- Нарушение целостности кожных покровов в предполагаемом месте нанесения.
- Беременность (III триместр).
- Период грудного вскармливания.
- Детский возраст (до 12 лет).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

.....

Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент применения.

На прогрессирование заболевания не влияет

.....





СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Гель применяется **наружно**.

Взрослым и детям старше 12 лет препарат наносят тонким слоем на кожу над очагом воспаления/местом травмы 2-3 раза в сутки, слегка втирая в кожу.

Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны.

Разовая доза препарата: 2 – 4 г (что по объему сопоставимо соответственно с размером вишни или грецкого ореха) достаточно для обработки зоны площадью 400 – 800 см².

Длительность лечения зависит от показаний и отмечаемого эффекта. Препарат не следует применять более 14 дней без рекомендации врача. Если через 7 дней применения терапевтический эффект не наблюдается или состояние ухудшается, следует обратиться к врачу.

Применение окклюзионной повязки в течение 10 часов приводит к трехкратному увеличению резорбции диклофенака.



Рекомендация: если руки не являются зоной локализации боли, то после нанесения препарата их необходимо вымыть.





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Если у вас остались вопросы,
мы всегда готовы на них ответить



АО «ДОМИНАНТА-СЕРВИС», 142100,
Московская обл., г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49,
пом. 1, ком. 223



dominanta-service.ru



info@dn-serv.ru



+7 (495) 580-30-60