

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Кетопрофен

Регистрационный номер: ЛСР-005801/08

Торговое наименование препарата: Кетопрофен

Международное непатентованное название: Кетопрофен

Лекарственная форма: гель для наружного применения

Состав

В 100 г геля содержится:

Активное вещество: кетопрофен 2,5 г

Вспомогательные вещества: карбопол 940, этанол 96 % (этанол), троламин, нипагин (метипарагидроксибензоат), вода

Описание

Прозрачный или слегка опалесцирующий, однородный, бесцветный или с желтоватым оттенком гель.

Фармакотерапевтическая группа

Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП)

Код АТХ: M02AA10 Фармакологическое действие

Оказывает местное противовоспалительное, анальгезирующее действие. Основным механизмом действия препарата связан с подавлением активности циклооксигеназы 1 и 2, регулирующей синтез простагландинов. При суставном синдроме использование препарата позволяет уменьшить боль в покое и при движении, уменьшить утреннюю скованность, припухлость суставов.

Фармакокинетика

При местном применении всасывается медленно, практически не кумулирует. Биодоступность геля около 5%. После применения в дозе 50-150 мг концентрация в плазме через 5-8 часов составляет 0,08-0,15 мкг/мл.

Метаболизируется путем конъюгации с глюкуроновой кислотой. Активных метаболитов не образуется.

Показания к применению

- Заболевания опорно-двигательного аппарата (суставной синдром при ревматизме и обострении подагры, ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, остеоартроз, остеохондроз с корешковым синдромом, радикулит, воспалительное поражение связок, сухожилий, бурсит, ишиас, люмбаго);
- Мышечные боли ревматического и неревматического происхождения;
- Посттравматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата (повреждения и разрывы связок, ушибы).

Противопоказания

Гиперчувствительность, мокнущие дерматозы, экзема, инфицированные ссадины, раны, беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет).

Способ применения и дозы

Наружно.

Полоску геля длиной 4-6 см наносят легкими массирующими движениями на кожу в область болезненности и воспаления. Продолжительность использования без консультации врача не более 10 дней.

Побочные действия

Редко - *аллергические реакции*, гиперемия кожи, фотосенсибилизация, кожная экзантема, пурпура. В таких случаях лечение препаратом следует прекратить.

Зуд, чувство жжения в месте нанесения препарата.

Передозировка

Крайне низкая системная абсорбция активных компонентов препарата при наружном применении делает передозировку практически невозможной.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При наружном применении кетопрофена в виде геля лекарственные и другие взаимодействия не установлены.

Особые указания

Не наносить на открытые раны и воспаленную кожу!

Избегать попадания в глаза (опасности раздражения конъюнктивы) и на слизистые оболочки.

После работы с гелем необходимо сразу же вымыть руки. Не применять с окклюзионными (воздухонепроницаемыми) повязками!

Нет данных о влиянии на способность вождения машины и работы с техникой.

Форма выпуска

Гель для наружного применения 2,5 %.

По 50 г геля в тубу из ламината полиэтилен/алюминиевая фольга.

Тубу вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

Список Б.

В темном, сухом месте при температуре 15-25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

4 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель: ВетПром АД, Болгария

2400 Радомир, ул. Отец Паисий, 26

Представитель производителя в РФ, уполномоченный на принятие претензий от потребителей: ЗАО "ДОМИНАНТА-СЕРВИС"

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, тел. (495) 580-30-60

