

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению лекарственного препарата для медицинского применения**  
**«ТАДИМАКС®»**

**Регистрационный номер:** ЛП 002170

**Наименование препарата:** ТАДИМАКС

**Лекарственная форма:** таблетки покрытые пленочной оболочкой

**Состав на одну таблетку:**

*активные компоненты:* 371,3 мг густого водного экстракта (14,5:1) из смеси: Кринума листьев - 2 г, Анемарены корневищ - 0,666 г, Бархата коры - 0,666 г, Пустырника травы - 0,666 г, Персика семян - 0,083 г, Алисматиса корневищ - 0,830 г, Пиона корней - 0,500 г, Коричника коры - 0,0083 г;

*вспомогательные компоненты:* кремния диоксид коллоидный - 0,055 г, крахмал - 0,220 г, магния стеарат - 0,0065 г, гипромелоза - 0,007 г, тальк - 0,007 г, титана диоксид - 0,001 г, макрогол 6000 - 0,0015 г, оксид железа красный (Е 172) - 0,0003 г, оксид железа черный (Е 172) - 0,0004 г.

**Описание:** таблетки с фаской двояковыпуклые овальной формы, покрытые оболочкой коричневого цвета. Ядро коричневого цвета, на разрезе коричневого цвета с многочисленными мелкими желтыми вкраплениями.

**Фармакотерапевтическая группа:** Средство лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы растительного происхождения.

**Код АТХ:** G04CX

**Фармакологические свойства:** Препарат обладает противовоспалительным, анальгезирующим, умеренным ангиопротекторным действием .

**Показания к применению:** В комплексной терапии для устранения дизурических расстройств, при доброкачественной гиперплазия предстательной железы I и II стадии

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции печени

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**

Применение препарата у женщин не предусмотрено.

**Способ применения и дозы:** Внутрь по 2 таблетки 3 раза в день после еды. Препарат следует принимать по следующей схеме: 3 курса по 7 дней приема с перерывами между курсами по 7 дней. Продолжительность лечения определяется врачом.

**Побочное действие:** Возможны аллергические реакции. В 5 % случаях в начале применения препарата у пациентов возможно появление ощущения жжения в области заднего прохода. Это явление проходит в процессе приема препарата.

**Передозировка:** Случаев передозировки препарата ТАДИМАКС® не зарегистрировано.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не описано.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, работать с механизмами:**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска:** таблетки, покрытые плёночной оболочкой; по 21 таблетке в блистеры алюминиевые. По 2 или 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения:** В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

**Хранить в недоступном для детей месте!**

**Срок годности:** 3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Отпуск из аптек:** по рецепту

**Производитель:**

«ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНИ», д. 253, ул.

Зунг Си Тхань Тхе, р-он Тхань Тхе, Дананг Сити, Вьетнам.

Тел. (84-511) 760129.

**Адрес и телефон организации для направления претензий потребителей:**

ЗАО «Доминанта-Сервис»

142100, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

Тел/факс (495) 580-30-60