

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

KZ.16.01.98.003.E.000200.02.21 от 23 февраля 2021 года

Продукция: Биологически активная добавка к пище ВИТАМИН С + ЦИНК. Изготовлена в соответствии с документами: Eurorean Pharmacopoeia, спецификация. (Далее согласно приложению)

Изготовитель (Производитель): "Фармацевтический завод МИЛВЕ АД", с. Търнак, общ. Бяла Слатина, Болгария

Заявитель: "Дансон-БГ" ООД, 2400, г. Радомир, ул. Отец Паисий, 26, Болгария

Соответствует: ТР ТС 021/2011 утв. Реш. КТС от 09.12.2011 г. № 880, ТР ТС 022/2011 утв. Реш. КТС от 09.12.2011 г. № 881.

Свидетельство выдано на основании: Протокол испытаний ИЛ ТОО "НУТРИТЕСТ" № 281Р от 17.07.2020 года, экспертное заключение Экспертного совета по регистрации БАД к пище, детского питания, пищевых добавок и др. № 16/ЭК-220 от 17.08.2020 года.

Срок действия: 22.02.2026 г.

Заместитель председателя
Н. Садвакасов



Комитет санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

23 февраля

2021 года

KZ.16.01.98.003.E.000200.02.21

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витамина С и цинка. Условия хранения: хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Состав: одна капсула содержит: Витамин С (аскорбиновая кислота) 500 мг*, цинка сульфат в пересчете на цинк 10 мг**. Вспомогательные вещества – крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, шеллак (E904), гидроксипропилметилцеллюлоза. Состав капсулы – желатин, кармин (E120). Дозировка и способы применения: взрослым рекомендуется принимать по 1 капсуле в сутки, запивая достаточным количеством воды. Высвобождение активных веществ продолжается в течении 9-12 часов. Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам продукта; не следует назначать большие дозы больным с повышенной свертываемостью крови, тромбофлебитами и склонностью к тромбозам. Форма выпуска: 30, 60 капсул пролонгированного действия. Срок годности 3 года. Не является лекарством.

Заместитель председателя
Н. Садвакасов

